

## I. تمهيد :

## 01. نوع المسائل التي نريد حلها :

## مثال 1 :

- صندوق يحتوي على 5 كرات مرقمة من 1 إلى 5. نسحب كرتين من الصندوق على الشكل التالي .
- الحالة 1 : السحب للكرتين يكون بالتتابع وبارجاع الكرة الأولى المسحوبة إلى الصندوق . ( السحب بالتتابع و بإحلال طوله 2 )
- الحالة 2 : السحب للكرتين يكون بالتتابع وبدون إرجاع الكرة الأولى المسحوبة إلى الصندوق . ( السحب بالتتابع وبدون بإحلال طوله 2 )
- الحالة 3 : السحب للكرتين يكون دفعة واحدة ( أي في نفس الوقت أو أيضا في آن واحد ) ( السحب بتأي طوله 2 )
1. ما هو عدد السحبات الممكنة ؟ ( في كل حالة )
2. ما هو عدد السحبات حيث الكرتين تحملان رقم زوجي ؟ مجموع الرقمين يكون أصغر من 4 ؟ ..... ( في كل حالة ) .

## مثال 2 :

- A و B و C و D و E 5 نقط من المستوى حيث كل 3 نقط من بين هذه النقط غير مستقيمة .
1. ما هو عدد المتجهات التي يمكن إنشاؤها و طرفيها نقطتين من بين هذه النقط تبعا للحالتين ؟
- أ - نقطتين.
- ب - نقطتين مختلفتين .
- ج - A و B و C و D و E تمثل الحروف الأولى ل 5 متسابقين في العدوي الريفي . نهتم بالرتب المحصل عليها من طرفهم بعد انتهاء السباق مع العلم أن أي رتبة لا تحتل إلا من طرف متسابق واحد و واحد فقط .
2. أ - ما هو عدد المستقيمات التي يمكن إنشاؤها و المارة من نقطتين مختلفتين من بين هذه النقط ؟
- ب - ما هو عدد المثلثات التي يمكن رسمها حيث رؤوسه هي هذه النقط ؟

## 02. الهدف من الدرس :

- الهدف من الدرس هو إعطاء الأدوات و المنهجية و المبرهنات لكي يكون الجواب واضح و صحيح و بكل سرعة .
- لكن هذه المبرهنات خاصة بدروس المتعلقة " بالمجموعات و التطبيقات " و لتطبيق هذه الدروس يجب تريض المسألة المطروحة علينا أي بتأويل ألفاظ النص إلى ألفاظ : المجموعات - الأجزاء - الأزواج - المتلوثات - و بصفة عامة  $p$ -uplets - التطبيقات - التطبيقات الشمولية - التطبيقات التباينية - التطبيقات التقابلية ....

## II. مجموعة منتهية - رئيسي مجموعة :

## 01. تعريف :

E مجموعة و n عدد صحيح طبيعي غير منعدم .

إذا كان عدد عناصر المجموعة E هو n عنصر نقول إن المجموعة E هي مجموعة منتهية .

العدد n يسمى رئيسي المجموعة E . و نرسم له ب :  $\text{card}E = n$  .

## 02. أمثلة :

$E = \{a, b, c, f\}$  مجموعة منتهية و  $\text{card}E = 4$  . أما المجموعات  $\mathbb{N}$  أو  $\mathbb{R}$  أو  $[0,1[$  .. فهي غير منتهية.

## 03. مجموعتان متقدرتان: Ensembles équipotents:

## 1- تعريف:



A و B مجموعتان منتهيتان. إذا وجد تطبيق تقابلي بين A و B نقول إن المجموعتان A و B متقدرتان .

## 2- خاصية :

A و B مجموعتان منتهيتان. A و B متقدرتان إذا و فقط إذا كان  $\text{card}A = \text{card}B$

**04.** العمليات بين المجموعات المنتهية و رئيسي: ( A و B مجموعتان منتهيتان حيث:  $\text{card}A = p$  و  $\text{card}B = n$  )

1- رئيسي التقاطع و الاتحاد:



■ A و B مجموعتان منفصلتان ( $A \cap B = \emptyset$ ) لدينا :  $\text{card}A \cap B = \text{card}A + \text{card}B$

■ بصفة عامة:  $\text{card}A \cap B = \text{card}A + \text{card}B - \text{card}A \cap B$



2- رئيسي الجداء الديكارتي :

■ A و B مجموعتان منتهيتان وغير فارغتان مع  $\text{card}A = p$  و  $\text{card}B = n$  لدينا :  $\text{card}A \times B = \text{card}A \times \text{card}B$

■ بصفة عامة :

■  $E_1; E_2; \dots; E_p$  مجموعات منتهية و غير فارغة لدينا :  $\text{card}E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p = \text{card}E_1 \times \text{card}E_2 \times \dots \times \text{card}E_p$

■ حالة خاصة:  $E_1 = E_2 = \dots = E_p = E$  إذن :  $\text{card}E^p = (\text{card}E)^p$



3- رئيسي متمم جزء A في E :

لدينا :  $\text{card}\bar{A} = \text{card}E - \text{card}A$  مع :  $C_E^A = \bar{A} = E \setminus A$

## III. المبدأ الأساسي للتعداد :

## 01. تمهيد :

لنعتبر الأرقام التالية : 3 و 4 و 5

نبحث عن عدد الأعداد التي يتم تكوينها من رقمين مختلفين من بين الأرقام السابقة .

**طريقة " عفوية "** : يمكن أن نجد الأعداد التالية :

34 - 53 - 43 - 35 - 45 - 54 إذن هناك 6 أعداد

**طريقة أخرى :**

لدينا كل عدد مكون من رقمين يكتب على شكل ba

رقم a يمثل الوحدات ؛ رقم b يمثل العشرات

- الاختيار الأول يكون لرقم الوحدات a عدد الكيفيات لاختياره هو 3.
- الاختيار الثاني يكون لرقم العشرات b عدد الكيفيات لاختياره هو 2.
- عدد الأعداد هي  $2 \times 3$
- وهذه الكيفيات يمكن تمثيلها على الشكل التالي ويسمى شجرة الإمكانيات.

الاختيار الأول: Premier choix .

عدد الكيفيات : nombres des manières .

شجرة الإمكانيات : arbre des cas

## 02. مبدأ الجداء

نعتبر تجربة تشمل p اختيارا. مع  $(p \in \{1, 2, 3, \dots\})$

- إذا كان الاختيار الأول يتم ب :  $n_1$  كيفية مختلفة.
- إذا كان الاختيار الثاني يتم ب :  $n_2$  كيفية مختلفة.
- إذا كان الاختيار الثالث يتم ب :  $n_3$  كيفية مختلفة
- .....
- إذا كان الاختيار الذي رقمه p يتم ب :  $n_p$  كيفية مختلفة.

فإن عدد الكيفيات التي يتم بها ال p اختيارات هو  $n_1 \times n_2 \times n_3 \times \dots \times n_p$

## 03. مثال:


نرمي نردا ( له 6 وجوه ) مرتين متتاليتين .

كل نتيجة مكونة من نتيجة الرمية الأولى ثم من بعد ذلك نتيجة الرمية الثانية تسمى نتيجة ممكنة أو إمكانية


- حدد عدد النتائج الممكنة.
  - الرمية الأولى تعطي 6 اختيارات (6 نتائج أو 6 حالات).
  - الرمية الثانية تعطي 6 اختيارات (6 نتائج أو 6 حالات).
  - عدد النتائج الممكنة بعد رميتين هو  $6 \times 6 = 36$
- حدد عدد النتائج الممكنة حيث في الرمية الأولى نحصل على عدد زوجي .
  - في الرمية الأولى هناك 3 اختيارات (نتائج ممكنة).
  - في الرمية الثانية هناك 6 اختيارات (نتائج ممكنة).
  - ومنه : عدد النتائج الممكنة هو  $3 \times 6 = 18$

IV. عدد التطبيقات من مجموعة E نحو مجموعة F ( E و F منتهيتان وغير فارغتين )

## 01. نشاط :



A و B مجموعتان منتهيتان وغير فارغتين. نريد تحديد عدد التطبيقات من مجموعة A نحو مجموعة B مع  $\text{card}A = n$  و  $\text{card}B = p$  نضع  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  و  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_p\}$ .



- نأخذ  $a_1$  من A له p اختيار كصورة من B .
  - نأخذ  $a_2$  من A له p اختيار كصورة من B .
  - .....
  - .....
  - نأخذ  $a_n$  من A له p اختيار كصورة من B .
- ومنه : عدد التطبيقات من A نحو B هو :

$$\underbrace{p \times p \times \dots \times p}_n = p^n = (\text{card}B)^{\text{card}A}$$

## 02. خاصية :

A و B مجموعتان منتهيتان وغير فارغتين عدد التطبيقات من A نحو B هو :  $(\text{card}B)^{\text{card}A}$

## 03. مثال 1 :

نرمي نردا مرتين متتاليتين .

كل نتيجة متكونة من نتيجة الرمية الأولى ثم من بعد ذلك نتيجة الرمية الثانية تسمى نتيجة ممكنة أو إمكانية .

3. حدد عدد النتائج الممكنة.

• الرمية الأولى تعطي 6 اختيارات ( 6 نتائج أو 6 حالات ) .

• الرمية الثانية تعطي 6 اختيارات ( 6 نتائج أو 6 حالات ) .

• عدد النتائج الممكنة بعد رميتين هو  $6 \times 6 = 36$

4. حدد عدد النتائج الممكنة حيث في الرمية الأولى نحصل على عدد زوجي .

• في الرمية الأولى هناك 3 اختيارات ( نتائج ممكنة ) .

• في الرمية الثانية هناك 6 اختيارات ( نتائج ممكنة ) .

• ومنه : عدد النتائج الممكنة هو  $3 \times 6 = 18$

طريقة ثانية :

نعتبر المجموعتين  $A = \{L_1, L_2\}$  و  $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

مع  $L_1$  القذفة الأولى  $L_2$  القذفة الثانية.

عندما نقذف النرد في المرة الأولى يعطي مثلا 5 و القذفة الثانية تعطي 3 .  
هذه النتيجة المحصل عليها بعد الرميتين تمثل التطبيق التالي .

و منه كل نتيجة محصل عليها بعد القذفتين تمثل تطبيق من A نحو B .

بالتالي عدد النتائج المحصل عليها هو عدد التطبيقات من A نحو B .

خلاصة : عدد النتائج المحصل عليها هو :  $(\text{card}B)^{\text{card}A} = 6^2 = 36$


## 04. مثال 2 :

لقطعة نقود وجهين : **فظهر القطعة** نرسم له ب: **P (PILE)**؛ **وجه القطعة** الآخر نرسم له ب: **F (face)**

نرمي قطعة نقود ثلاثة مرات متتالية ( عندما نكتب أن النتيجة كانت: **PPF** نقصد أن القذفة الأولى أعطت **F** و القذفة 2 أعطت **P** والقذفة 3 أعطت **P** ) .


حدد عدد النتائج الممكنة . ( أعط الجواب )

**جواب:** عند رمينا للقطعة النقود ثلاث مرات متتالية لدينا:



- الرمية الأولى تعطي : نتيجتين مختلفتين
- ولكل نتيجة للرمية الأولى هناك نتيجتين للرمية الثانية.
- و لكل نتيجة للرمية الثانية هناك نتيجتين للرمية الثالثة .
- إذن سيكون عدد نتائج بعد الرمية الثالثة هو  $2 \times 2 \times 2 = 8$

ملحوظة: هذه التجربة يمكن تمثيلها في التمثيل التالي يسمى شجرة الإمكانيات.



V. الترتيبات بدون تكرار:

01. ترتيبية ( مثال ) :

سباق في العدو الريفي جرى بين 4 عدائين A و B و C و D بعد انتهاء السباق كان توزيع جوائز فقط كالتالي 50 000 dh للرتبة الأولى و 10 000 dh للرتبة الثانية المحصل عليها من طرف العدائين مع العلم أن أي رتبة لا يمكن أن يحتلها أكثر من عداء .

- أعط حالة لتوزيع الجائزتين على العدائين الأربعة.

1- جواب :

- نعطي حالة:

توزيع الجائزة الأولى على العداء D و الجائزة الثانية على B نمثلها باختصار ب  $\begin{matrix} 1 \\ D \end{matrix}$   $\begin{matrix} 2 \\ B \end{matrix}$  أو باختصار ب DB . وهذه النتيجة ليست

كالنتيجة BD المحصل عليها بعد انتهاء السباق .

2- مفردات :

كل نتيجة محصل عليه بعد انتهاء السباق تسمى ترتيبية بدون تكرار لعنصرين من بين 4 عناصر

3- تعريف :

لتكن مجموعة تحتوي على n عنصر مع  $(n \in \{1, 2, 3, \dots\})$

ليكن p عددا صحيحا طبيعيا حيث  $1 \leq p \leq n$

كل ترتيبية ل p عنصر مختار من بين n عنصر يسمى ترتيبية بدون تكرار ل p عنصر من بين n عنصر .

4- ملحوظة:

لسحب كرتين ( أو 3 كرات ..) بالترتيب وبدون إحلال (أي بدون إرجاع الكرة المسحوبة إلى الصندوق) يحتوي على n كرة. كل سحبة تمثل

ترتيبية ل 2 من بين n ( أو 3 من بين n ..).

$n \in \mathbb{N}^*$  العدد  $1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times n$  يرمز له ب:  $n!$  إذن  $n! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \dots \times n$  ويقراً : n عاملي.

مثال :  $3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$

نضع :  $1! = 1$  و  $0! = 1$  .

02. عدد الترتيبات :

1- خاصية:

عدد الترتيبات : ل p عنصر من بين n عنصر (مع  $1 \leq p \leq n$ ) هو العدد الصحيح الطبيعي الذي نرسم له بالرمز  $A_n^p$  حيث :

$$A_n^p = \underbrace{n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-p+1)}_p = \frac{n!}{(n-p)!}$$

2- أمثلة:

مثال 1: نحسب :  $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$  (هناك عاملين) . نحسب  $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$  (هناك 3 عوامل) .



## مثال 2 :

يحتوي كيس على 5 كرات حمراء و 2 من اللون الأخضر . نسحب عشوانيا وبتتابع وبدون إحلال كرتين من الصندوق (أي بدون إرجاع الكرة الأولى إلى الصندوق).

1- ما هو عدد السحبات الممكنة

2- ما هو عدد السحبات التي تكون فيها الكرتين من اللون الأحمر

جواب:

الطريقة الأولى:

1 عدد السحبات الممكنة

الكرة الأولى المسحوبة لها 7 اختيارات

الكرة الثانية المسحوبة لها 6 اختيارات (لأن الكرة الأولى تبقى خارج الصندوق)

إذن عدد السحبات الممكنة هو  $7 \times 6 = 42$

الطريق الثانية:

كل سحبة لكرتين بتتابع و بدون إحلال من بين 7 كرات يمثل ترتيبية ل 2 من بين 7 ؛ إذن عدد السحبات هو عدد الترتيبات ل 2 من بين 7.

$$A_7^2 = \frac{7!}{(7-2)!} = \frac{7!}{5!} = 7 \times 6 = 42$$


2 عدد السحبات التي تكون فيها الكرتين من اللون الأحمر

الكرة الأولى المسحوبة حمراء لها 5 اختيارات .

الكرة الثانية المسحوبة حمراء لها 4 اختيارات (لأن الكرة الأولى المسحوبة كانت حمراء)

إذن عدد السحبات الممكنة الكرتين من اللون أحمر  $5 \times 4 = 20$

ملحوظة : يمكن استعمال شجرة الإمكانيات .



## 3- ملاحظات :

$$A_n^n = n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1 = n! \quad \text{و} \quad A_n^0 = \frac{n!}{(n-0)!} = 1 \quad \text{و} \quad A_n^1 = \frac{n!}{(n-1)!} = n$$

## VI. التباديلات :

حالة خاصة بالنسبة لترتيبات: ترتيب  $n$  عنصر من بين  $n$  عنصر.

## 1- نشاط :

سباق في العدو الريفي جرى بين 4 عدائين : A و B و C و D .  
نهتم بالترتيب المحصل عليه من طرف العدائين بعد انتهاء السباق مع العلم أن أي رتبة لا يمكن أن يحتلها أكثر من عداء .  
لنأخذ النتيجتين التاليتين : DABC ثم CBDA .. ماذا حدث لترتيب المتسابقين الأربعة بالنسبة للنتيجتين ؟

## 2- تعريف :

إذا رتبنا  $n$  عنصر من بين  $n$  عنصر (أي  $p = n$ ) هذه الترتيبية تسمى **تبديلة** ل  $n$  عنصر .

## 3- خاصية :

$$\text{عدد تبديلات ل } n \text{ عنصر هو العدد } n! \text{ مع } n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-1) \times n$$

## 4- مثال :

سباق في العدو الريفي جرى بين 4 عدائين : A و B و C و D .  
ما هي النتائج المحصل عليها بعد انتهاء السباق مع العلم أن أي رتبة لا يمكن أن يحتلها أكثر من عداء .

جواب:

كل نتيجة نحصل عليها بعد السباق تمثل تبديلة ل 4 .

إذن عدد النتائج المحصل عليها بعد إجراء السباق هي عدد التباديلات ل 4 . ومنه عدد النتائج هو  $4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$



## VII. التاليفات :

## 01. تأليفة :

## 1- مثال :

لنعتبر المجموعة الآتية :  $E = \{a, b, c, d\}$  . نبحث عن عدد الأجزاء التي تحتوي على عنصرين من  $E$  .

الأجزاء هي:  $\{a, b\}$  و  $\{a, c\}$  و  $\{a, d\}$  و  $\{b, c\}$  و  $\{b, d\}$  و  $\{c, d\}$  إذن هناك 6 أجزاء ،

3- مفردات : كل جزء يسمى تأليفة لعنصرين من بين أربعة عناصر

3- ملحوظة :

• الجزء  $\{a, b\} = \{b, a\}$  إذن الترتيب غير مهم في التأليفة.

• لسحب كرتين ( أو 3 كرات ...) و في آن واحد من الصندوق ( أي دفعة واحدة ) يحتوي على  $n$  كرة. كل سحبة تمثل تأليفة ل 2 من بين  $n$  ( أو 3 من بين  $n$  ... )

4- تعريف :

لكن  $E$  مجموعة تحتوي على  $n$  عنصر مع  $(n \in \{1, 2, 3, \dots\})$

كل جزء من  $E$  يحتوي على  $p$  عنصر  $(p \leq n)$  يسمى تأليفة ل  $p$  عنصر من بين  $n$  عنصر.

## 02. عدد التاليفات :

## 1- خاصية:

عدد التاليفات ل  $p$   $(p \in \{0, 1, 2, 3, \dots\})$  عنصر من بين  $n$  عنصر هو العدد الصحيح الطبيعي الذي نرمز له ب :

$$C_n^p = \frac{A_n^p}{p!} = \frac{n!}{(n-p)! \times p!} = \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \dots \times (n-p+1)}{1 \times 2 \times 3 \times \dots \times p}$$

2- مثال :  $C_7^3 = \frac{7 \times 6 \times 5}{1 \times 2 \times 3} = 35$   $C_n^p = \frac{n!}{(n-p)! \times p!}$

3- ملحوظة:  $C_n^0 = 1$  و  $C_n^1 = n$  و  $C_n^n = 1$

4- مثال : يحتوي كيس على 4 كرات حمراء  $R$  و 3 كرات من اللون الأخضر  $V$  .

نسحب عشوائيا و في آن واحد ثلاث كرات من الصندوق .

1- ما هو عدد السحبات الممكنة

2- ما هو عدد السحبات حيث الكرات كلها حمراء .

3- ما هو عدد السحبات حيث نحصل على كرة واحدة فقط حمراء من بين الكرات 3 المسحوبة .

جواب:

1-  $C_7^3 = 35$  (2)  $C_4^3 = 4$  (3)  $C_4^1 \times C_3^2 = 4 \times 3$

## VIII. حدانية نيوتن : BINOMES DE NEWTON


1- خاصيات معاملات حدانية:  $n$  و  $p$  من  $\mathbb{N}$  حيث  $0 \leq p \leq n$  .

• تماثلية:  $C_n^p = C_n^{n-p}$  . ( بين ذلك ) . نتائج :  $C_n^0 = C_n^n = 1$  و  $C_n^1 = C_n^{n-1} = n$  .

مثال : عدد كيفية اختيار ممثلين لقسم مكون ن 40 تلميذ يساوي عدد كيفية اختيار 38 تلميذ من بين 40 تلميذ .

• علاقة باسكال: relation de Pascal :  $C_n^p + C_n^{p+1} = C_{n+1}^{p+1}$  مع  $n$  و  $p$  من  $\mathbb{N}$  حيث  $0 \leq p \leq n-1$  .

( بين على ذلك بالترجع )





## 2- مثلث باسكال : triangle de Pascal.

$\begin{matrix} p \\ n \end{matrix}$	0	1	2	3	4	5	6	...	p	p+1	...	n-1	n	n+1
0	1													
1	1	1												
2	1	2	1											
3	1	3	3	1										
4	1	4	6	4	1									
5	1	5	10	10	5	1								
6	1	6	15	20	15	6	1							
⋮							1							
p							1							
p+1									1					
⋮											1			
n-1										1		1		
n										$C_n^p$	+	$C_n^{p+1}$		1
n+1												$C_{n+1}^{p+1}$		1

3- حدانية نيوتن :  
خاصية:

$$\forall n \in \mathbb{N}^* : (a+b)^n = \sum_{i=0}^{i=n} C_n^i a^{n-i} b^i \quad \text{ليكن } a \text{ و } b \text{ من } \mathbb{R} \text{ لدينا :}$$

4- تطبيق:

• أحسب :  $(1+1)^n$  بطريقتين مختلفتين :

$$\text{لدينا : } 2^n = (1+1)^n = \sum_{i=0}^{i=n} C_n^i 1^{n-i} 1^i = \sum_{i=0}^{i=n} C_n^i = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n$$

$$\text{ومنه : } \sum_{i=0}^{i=n} C_n^i = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^n = 2^n$$



- $\text{card}(\mathcal{P}(E))$  : عدد الأجزاء التي لها 0 عنصر هو  $C_n^0$  ؛ عدد الأجزاء التي لها 1 عنصر هو  $C_n^1$  ؛ ..... عدد الأجزاء التي لها  $n$  عنصر هو  $C_n^n$  ؛ ومنه عدد الأجزاء ل  $E$  هو  $C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = (1+1)^n = 2^n$
- 5- برهان لحدانية نيوتن : نستدل على ذلك بالترجع :
- نتحقق بأن العلاقة صحيحة ل :  $n = 1$  .

لدينا :  $\sum_{i=0}^{i=1} C_n^i a^{1-i} b^i = C_1^0 a^{1-0} b^0 + C_1^1 a^{1-1} b^1 = 1a + 1b = a + b = (a + b)^1$  إذن العلاقة صحيحة ل  $n = 1$  .

- نفترض ان العلاقة صحيحة إلى الرتبة  $n$  : إذن  $(a + b)^n = \sum_{i=0}^{i=n} C_n^i a^{n-i} b^i$  مع  $n \in \mathbb{N}^*$  ( معطيات التراجع )

- نبين أن العلاقة صحيحة للرتبة  $n + 1$  أي نبين أن :  $(a + b)^{n+1} = \sum_{i=0}^{i=n+1} C_{n+1}^i a^{n+1-i} b^i$  ؟ لدينا:

$$\begin{aligned}
 (a + b)^{n+1} &= (a + b)^n (a + b) \\
 &= \sum_{i=0}^{i=n} C_n^i a^{n-i} b^i (a + b) \\
 &= a \sum_{i=0}^{i=n} C_n^i a^{n-i} b^i + b \sum_{i=0}^{i=n} C_n^i a^{n-i} b^i \\
 &= \sum_{i=0}^{i=n} C_n^i a^{n-i+1} b^i + \sum_{i=0}^{i=n} C_n^i a^{n-i} b^{i+1} \\
 &= C_n^0 a^{n+1} b^0 + \sum_{i=1}^{i=n} C_n^i a^{n-i+1} b^i + \sum_{i=0}^{i=n-1} C_n^i a^{n-i} b^{i+1} + C_n^n a^{n-n} b^{n+1} \\
 &= a^{n+1} + \sum_{i=1}^{i=n} C_n^i a^{n-i+1} b^i + \sum_{i=0}^{i=n-1} C_n^i a^{n-i} b^{i+1} + b^{n+1} \\
 &= a^{n+1} + \sum_{i=1}^{i=n} C_n^i a^{n-i+1} b^i + \sum_{j=1}^{j=n} C_n^{j-1} a^{n-j+1} b^{j-1+1} + b^{n+1} ; (i = j-1) \\
 &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{k=n} C_n^k a^{n-k+1} b^k + \sum_{k=1}^{k=n} C_n^{k-1} a^{n-k+1} b^k + b^{n+1} ; (j = k) \\
 &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{k=n} C_n^k a^{(n+1)-k} b^k + \sum_{k=1}^{k=n} C_n^{k-1} a^{(n+1)-k} b^k + b^{n+1} \\
 &= a^{n+1} + \sum_{k=1}^{k=n} (C_n^k + C_n^{k-1}) a^{(n+1)-k} b^k + b^{n+1} \\
 &= C_{n+1}^0 a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^{k=n} (C_n^k + C_n^{k-1}) a^{n-k+1} b^k + C_{n+1}^{n+1} a^0 b^{n+1} \\
 &= C_{n+1}^0 a^{n+1} b^0 + \sum_{k=1}^{k=n} C_{n+1}^k a^{n-k+1} b^k + C_{n+1}^{n+1} a^0 b^{n+1} ; (C_n^{k-1} + C_n^k = C_{n+1}^k) \\
 &= \sum_{k=0}^{k=n+1} C_{n+1}^k a^{n-k+1} b^k = \sum_{j=0}^{j=n+1} C_{n+1}^j a^{n-j+1} b^j
 \end{aligned}$$

- إذن العلاقة صحيحة للرتبة  $n + 1$  . خلاصة :  $(a + b)^n = \sum_{i=0}^{i=n} C_n^i a^{n-i} b^i$  مع  $\forall n \in \mathbb{N}^*$  من  $\mathbb{R}$  .