

# عموميات حول الدوال العددية


تذكير : دراسة بعض الدوال الإعتيادية

دراسة و تمثيل الدالة  $(a \neq 0) \quad f : x \mapsto ax^2 + bx + c$

$$\alpha = \frac{-b}{2a}$$

التمثيل المباني للدالة  $x \mapsto ax^2 + bx + c$  عبارة عن شكل مرجع رأسه  $\Omega(\alpha, f(\alpha))$  و محوره هو المستقيم الذي معادلته  $x = \alpha$ .

$a > 0$	$a > 0$																								
<table border="1"> <tr> <td><math>x</math></td><td><math>-\infty</math></td><td><math>-b/2a</math></td><td><math>+\infty</math></td></tr> <tr> <td><math>f(x)</math></td><td></td><td><math>f(-b/2a)</math></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td><math>\nearrow</math></td><td><math>\searrow</math></td><td></td></tr> </table>	$x$	$-\infty$	$-b/2a$	$+\infty$	$f(x)$		$f(-b/2a)$			$\nearrow$	$\searrow$		<table border="1"> <tr> <td><math>x</math></td><td><math>-\infty</math></td><td><math>-b/2a</math></td><td><math>+\infty</math></td></tr> <tr> <td><math>f(x)</math></td><td></td><td><math>\searrow</math></td><td><math>\nearrow</math></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td><math>f(-b/2a)</math></td><td></td></tr> </table>	$x$	$-\infty$	$-b/2a$	$+\infty$	$f(x)$		$\searrow$	$\nearrow$			$f(-b/2a)$	
$x$	$-\infty$	$-b/2a$	$+\infty$																						
$f(x)$		$f(-b/2a)$																							
	$\nearrow$	$\searrow$																							
$x$	$-\infty$	$-b/2a$	$+\infty$																						
$f(x)$		$\searrow$	$\nearrow$																						
		$f(-b/2a)$																							



دراسة و تمثيل الدالة  $f : x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$


نعتبر الدالة  $f : x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$   
الدالة  $f$  تسمى دالة متخططة

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{-d}{c} \right\} = \left[ -\infty, \frac{-d}{c} \right] \cup \left[ \frac{-d}{c}, +\infty \right]$$

التمثيل المباني للدالة  $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$  عبارة عن هذلول مركزه  $\Omega = \left( \frac{-d}{c}, \frac{a}{c} \right)$  و مقارباه هما المستقيمان اللذين معادلتاهما :

$$y = \frac{a}{c} \text{ و } x = \frac{-d}{c}$$

يسمى محددة الدالة  $f : x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$  العدد  $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$




دراسة الدالة

$f : x \mapsto \sqrt{x+a}$

نعتبر الدالة


$$D_f = [-a, +\infty[$$




### الدالة الزوجية – الدالة الفردية

لتكن  $f$  دالة عددية و  $D_f$  مجموعة تعريفها.

$f$  زوجية إذا وفقط إذا كان لكل  $x$  من  $D_f$  :  $f(-x) = f(x)$  •



$f$  فردية إذا وفقط إذا كان لكل  $x$  من  $D_f$  :  $f(-x) = -f(x)$  •



- لتكن  $f$  دالة عددية و  $C_f$  منحناها في معلم متواحد  $\left(O, \vec{i}, \vec{j}\right)$ .
- $f$  زوجية يعني أن  $C_f$  متماثل بالنسبة لمحور الأراتيب
  - $f$  فردية يعني أن  $C_f$  متماثل بالنسبة لأصل المعلم

### الدالة المكبورة – الدالة المصغورة – الدالة المحدودة


- لتكن  $f$  دالة عددية معرفة على مجال  $I$  من  $\mathbb{R}$ .
- نقول إن  $f$  مكبورة على  $I$  إذا وجد عدد حقيقي  $M$  بحيث :  $f(x) \leq M$  لكل  $x$  من  $I$
  - نقول إن  $f$  مصغورة على  $I$  إذا وجد عدد حقيقي  $m$  بحيث :  $m \leq f(x)$  لكل  $x$  من  $I$
  - نقول إن  $f$  محدودة إذا كانت  $f$  مكبورة و مصغورة

- لتكن  $f$  دالة عددية معرفة على مجال  $I$  من  $\mathbb{R}$ .  
تكون  $f$  دالة محدودة على  $I$  إذا وفقط إذا وجد عدد حقيقي موجب  $k$  بحيث :  $|f(x)| \leq k$  لكل  $x$  من  $I$

### الدالة الدورية

نقول إن  $f$  دالة دورية إذا وجد عدد حقيقي  $T$  موجب قطعاً بحيث :

$$\begin{cases} (\forall x \in D_f) : x + T \in D_f \\ (\forall x \in D_f) : f(x + T) = f(x) \end{cases}$$



العدد  $T$  يسمى دور للدالة  $f$   
أصغر دور موجب قطعاً يسمى دور الدالة  $f$

إذا كان  $T$  دوراً لدالة عددية  $f$  فإنه لكل  $k$  من  $\mathbb{Z}$  :

### مطاريف دالة عددية

لتكن  $f$  دالة عددية معرفة على مجال  $I$  و  $a$  عنصراً من المجال  $I$

- نقول إن  $(a)$  هي القيمة القصوى للدالة  $f$  على المجال  $I$  ، إذا كان :  $f(x) \leq f(a)$  لـ كل  $x$  من  $I$
- نقول إن  $(a)$  هي القيمة الدنيا للدالة  $f$  على المجال  $I$  ، إذا كان :  $f(x) \geq f(a)$  لـ كل  $x$  من  $I$

### مقارنة دالتيـن – التأوـيل الـهندسي

لتـكن  $f$  و  $g$  دالـتين عـدديتـين و  $D_f$  و  $D_g$  عـلى التـوالـي مـجمـوعـة تـعـرـيفـهـما.

$$D = D_f = D_g \text{ حيث } \begin{cases} D_f = D_g \\ (\forall x \in D) ; f(x) = g(x) \Leftrightarrow f = g \end{cases}$$

لتكن  $f$  و  $g$  دالتين عدديتين معرفتين على مجال  $I$ .  
نقول إن  $f$  أصغر من أو تساوي  $g$  على  $I$  ، إذا وفقط إذا كان :  $(\forall x \in I); f(x) \leq g(x)$   
هندسياً : منحنى الدالة  $f$  على  $I$  يوجد تحت منحنى الدالة  $g$  على  $I$ .

### مركب دالتين

لتكن  $f$  و  $g$  دالتين عدديتين معرفتين على التوالي على  $D_g$  و  $D_f$  و  

$$D = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_f, f(x) \in D_g\}$$
  
 الدالة العددية  $h$  المعرفة على  $D$  بما يلي :  $h(x) = g(f(x))$  ، تسمى مركب الدالتين  $f$  و  $g$  في هذا الترتيب و يرمز لها  
 بالرمز  $g \circ f$

### رتابة دالة عددية

- دالة عددية و  $I$  مجالاً ضمن  $D_f$   
 $f(a) \leq f(b)$  يعني أنه لكل عنصرين  $a$  و  $b$  من  $I$  : إذا كان  $a \leq b$  فإن  $f(a) \leq f(b)$
- دالة عددية قطعاً على  $I$  يعني أنه لكل عنصرين  $a$  و  $b$  من  $I$  : إذا كان  $a < b$  فإن  $f(a) < f(b)$
- دالة عددية تناصصية على  $I$  يعني أنه لكل عنصرين  $a$  و  $b$  من  $I$  : إذا كان  $a \leq b$  فإن  $f(a) \geq f(b)$
- دالة عددية تناصصية قطعاً على  $I$  يعني أنه لكل عنصرين  $a$  و  $b$  من  $I$  : إذا كان  $a < b$  فإن  $f(a) > f(b)$

دالة عددية و  $I$  مجالاً ضمن  $D_f$ .

- رتبية على  $I$  يعني  $f$  تزايدية أو تناصصية على  $I$ .
- رتبية قطعاً على  $I$  يعني  $f$  تزايدية قطعاً أو تناصصية قطعاً على  $I$ .

دالة عددية و  $D_f$  مجموعة تعرّيفها و  $a$  و  $b$  عنصراً مختلفان من  $D_f$

$$\text{العدد } T = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

لتكن  $f$  دالة عددية و  $T = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$  معدل تغيرها بين عنصرين مختلفين  $a$  و  $b$  من مجال  $I$  ضمن  $D_f$

- إذا كان  $T \geq 0$  فإن  $f$  تزايدية على  $I$
- إذا كان  $T > 0$  فإن  $f$  تزايدية قطعاً على  $I$
- إذا كان  $T \leq 0$  فإن  $f$  تناظرية على  $I$
- إذا كان  $T < 0$  فإن  $f$  تناظرية قطعاً على  $I$

دالة عددية مجموعه تعريفها  $D_f$  متماثلة بالنسبة للعدد 0

ليكن  $I$  مجالاً من  $\mathbb{R}^+$  ضمن  $D_f$  و  $I'$  مماثل  $I$  بالنسبة للعدد 0

❖ في حالة  $f$  دالة زوجية ، لدينا :

- إذا كانت  $f$  تزايدية على  $I$  فإنها تناظرية على  $I'$
- إذا كانت  $f$  تناظرية على  $I$  فإنها تزايدية على  $I'$

❖ في حالة  $f$  دالة فردية ، لدينا :  
لها نفس منحى التغيرات على كل من  $I$  و  $I'$ .

### رتابة مركب دالتين

لتكن  $f$  و  $g$  دالتين عدديتين معرفتين على التوالي على مجالين  $I$  و  $J$  بحيث :  $f(x) \in J$  لـ كل  $x$  من  $I$  ،  $(f(I) \subset J)$  لدينا :

- إذا كانت  $f$  تزايدية قطعاً على  $I$  و  $g \circ f$  تزايدية قطعاً على  $J$  فإن  $g \circ f$  تزايدية قطعاً على  $I$
- إذا كانت  $f$  تزايدية قطعاً على  $I$  و  $g$  تناظرية قطعاً على  $J$  فإن  $g \circ f$  تناظرية قطعاً على  $I$
- إذا كانت  $f$  تناظرية قطعاً على  $I$  و  $g$  تزايدية قطعاً على  $J$  فإن  $g \circ f$  تناظرية قطعاً على  $I$
- إذا كانت  $f$  تناظرية قطعاً على  $I$  و  $g$  تناظرية قطعاً على  $J$  فإن  $g \circ f$  تزايدية قطعاً على  $I$